

Humaan immunodeficiëntievirus (hiv)
in Nederland



hiv monitoring rapport


2025

samenvatting




Hiv in Nederland

Op 31 december 2024 leven er naar schatting 25.890 mensen met hiv, waarvan er 23.057 in zorg zijn.




Leeftijd

Verdeling over leeftijdsgroepen van mensen met hiv in zorg. De gemiddelde leeftijd van alle mensen met hiv in zorg is 52 jaar.



Wijze van hiv-overdracht



Door afrondingen tellen percentages niet altijd op tot 100%.

Verdeling over Nederland

	Aantal mensen met hiv-diagnose	Geschat aantal mensen die nog niet weten dat ze hiv hebben
Regio*		
Noord	1.486	175
Oost	2.813	250
Noord-Holland/Flevoland	9.153	295
Utrecht	1.391	70
Zuid-Holland Noord	1.826	235
Zuid-Holland Zuid	3.803	230
Zeeland/Brabant	2.679	320
Limburg	1.087	75
Onbekend	46	-
Totaal	24.282	1.650
Stad		
Amsterdam	6.404	180
Rotterdam	2.101	110
Den Haag	1.284	110
Utrecht	575	25
Eindhoven	420	60
Totaal	10.784	490


Geboorteregio

	Aantal mensen met hiv-diagnose	Percentage
Nederland	12.372	54
Sub-Sahara Afrika	2.916	13
West-Europa	1.153	5
Centraal-Europa	873	4
Oost-Europa en Centraal-Azië	726	3
Zuid-Amerika	1.946	8
Caribisch gebied	1.104	5
Zuid- en Zuidoost-Azië	910	4
Noord-Afrika en Midden-Oosten	547	2
Anders	389	2
Onbekend	121	1
Totaal	23.057	100

* Dit is de regionale indeling volgens de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG).


Trend over tijd

Hiv-diagnoses en geschat aantal hiv-infecties per jaar



Een opgelopen hiv-infectie is niet hetzelfde als een vastgestelde hiv-diagnose. Tussen het moment van infectie en de diagnose zitten vaak meerdere jaren. Het aantal hiv-infecties in de tijd wordt daarom niet rechtstreeks gemeten, maar geschat op basis van het aantal hiv-diagnoses, een mathematisch model en kennis van het beloop van de infectie. Daarom worden deze gerapporteerd als geschat aantal infecties.


Hiv-diagnoses bij mannen die seks hebben met mannen op basis van geboortegeneraties



Bij mannen die seks hebben met mannen (MSM) is de laatste jaren een stijging te zien in nieuwe hiv-diagnoses bij mensen geboren in de jaren tachtig, negentig en 2000. Bij MSM geboren vóór 1980 blijft het aantal nieuwe hiv-diagnoses dalen.

Recent opgelopen hiv-infectie

Mensen met een recent opgelopen hiv-infectie hebben minder dan 12 maanden voor de hiv-diagnose nog een negatieve hiv-testuitslag gehad.




Hoe groter het aandeel mensen met een recent opgelopen hiv-infectie bij hiv-diagnose hoe beter. Dit betekent dat hiv snel gediagnosticeerd is en kan worden behandeld. Tijdige behandeling voorkomt niet alleen schade aan de gezondheid maar ook verdere hiv-overdracht.

Nieuwe hiv-diagnoses in 2024




444 nieuwe hiv-diagnoses in 2024, waarvan:



- Mannen die seks hebben met mannen
- Andere mannen
- Vrouwen
- Trans personen




302 mensen met een al in het buitenland gestelde hiv-diagnose zijn in 2024 in Nederland komen wonen, waarvan:



- Mannen die seks hebben met mannen
- Andere mannen
- Vrouwen
- Trans personen

Van de 302 mensen met een al in het buitenland gestelde hiv-diagnose die in 2024 in Nederland zijn komen wonen, heeft 85% een door medicatie goed onderdrukt virus bij eerste controle in Nederland.


Geboorteregio van mensen met een al in het buitenland vastgestelde hiv-diagnose die in 2024 in Nederland zijn komen wonen



- Zuid-Amerika
- Sub-Sahara Afrika
- Oost-Europa en Centraal-Azië
- West-Europa
- Centraal-Europa
- Noord-Afrika en Midden-Oosten
- Caribisch gebied
- Zuid- en Zuidoost-Azië
- Anders
- Onbekend

Behandeling van hiv


Medicijngebruik in 2024




Onderbreking medicijngebruik



Langwerkende injecteerbare medicatie



Start van de behandeling na het eerste bezoek aan het behandelcentrum




Overleden

In 2024 zijn er 24 mensen overleden aan de gevolgen van een vergevorderde hiv-infectie (aids). Dit aantal is sinds 2015 ongeveer gelijk gebleven.

Hiv-zorgcontinuüm


Het hiv-zorgcontinuüm voor Nederland op 31 december 2024.



De behandeling van hiv is erop gericht om vermenigvuldiging van het virus te onderdrukken. Hierdoor kan de gezondheid zich herstellen en daarnaast kan hiv niet worden overgedragen. Zo draagt behandeling niet alleen bij aan het behoud van de gezondheid, maar ook aan het voorkomen van verspreiding van hiv.

Late hiv-diagnoses

Er is sprake van een late hiv-diagnose wanneer het aantal CD4-cellen lager is dan 350 per mm³, en/of er een gelijktijdige aids-diagnose is. Deze figuur laat voor de periode 2022-2024 het percentage mensen met een late hiv-diagnose zien binnen de verschillende leeftijdsgroepen en voor de verschillende groepen.




43% van de nieuwe hiv-diagnoses in de periode 2022-2024 betreft een late hiv-diagnose.

Met het stijgen van de leeftijd neemt het aandeel mensen met een late hiv-diagnose toe.

In bijna alle leeftijdsgroepen worden bij andere mannen en bij vrouwen procentueel gezien de meeste late hiv-diagnoses gevonden.


Ziekenhuisopname bij late en tijdige hiv-diagnose in de periode 2022-2024




PrEP

PrEP (Pre-Expositie Profylaxe) is een pil die mensen zonder hiv kunnen gebruiken om te voorkomen dat zij hiv krijgen. De werking van PrEP is optimaal wanneer het goed en regelmatig wordt ingenomen. Vanaf 2019 is PrEP in Nederland beschikbaar voor de doelgroepen mannen die seks hebben met mannen en trans personen via het nationale PrEP programma; vanaf 2024 is het beschikbaar voor iedereen.

PrEP-gebruik




In de periode 2018-2024 zijn er 179 mensen met een nieuwe hiv-diagnose in zorg gekomen die in het verleden in Nederland PrEP hebben gebruikt.




Geen PrEP-gebruik

In de periode 2018-2024 zijn er 774 mannen die seks hebben met mannen en trans personen met een nieuwe hiv-diagnose in zorg gekomen. Van deze groep is van 387 (50%) mensen bekend waarom ze geen PrEP hebben gebruikt.



Zwangerschap

In de periode 2016-2024 zijn 668 vrouwen met één of meerdere geregistreerde zwangerschappen in hiv-zorg geweest. Bij deze 668 vrouwen zijn er 1035 zwangerschappen geregistreerd in deze periode. Hiervan duurden 683 (66%) zwangerschappen ten minste 24 weken en eindigden met de geboorte van een kindje.




Duur van de zwangerschap	
≥37 weken	599
32-36 weken	68
24-31 weken	15
Exacte duur onbekend	1
Totaal	683

Wijze van bevallen	
Vaginaal	466
Keizersnede, gepland	109
Keizersnede, niet gepland	101
Onbekend	7
Totaal	683

Sinds de invoering van de standaardscreening op hiv bij alle zwangere vrouwen in Nederland is de overdracht van hiv van moeder op kind tijdens de zwangerschap en bevalling in de periode 2016-2024 zeer zeldzaam gebleken.

Borstvoeding

Bij vrouwen met hiv die tussen 2016 en 2024 zijn bevallen, is bij 49 zwangerschappen aangegeven dat borstvoeding werd gegeven. In alle gevallen hadden de vrouwen een onmeetbaar virusniveau. Er zijn geen gevallen van overdracht van hiv naar het kindje gerapporteerd.



Hiv-behandelcentra

In Nederland zijn 23 behandelcentra voor mensen met hiv:

- 1 Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar
- 2 Flevoziekenhuis, Almere
- 3 Amsterdam UMC, Amsterdam
- 4 DC Klinieken Laresse - HIV Focus Centrum, Amsterdam
- 5 OLVG, Amsterdam
- 6 Medisch Centrum Jan van Goyen (MC Jan van Goyen), Amsterdam
- 7 Rijnstate, Arnhem
- 8 HagaZiekenhuis (Leyweg site), Den Haag
- 9 HMC (Haaglanden Medisch Centrum), Den Haag
- 10 Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
- 11 Medisch Spectrum Twente (MST), Enschede
- 12 Adrz, Goes
- 13 Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Groningen
- 14 Spaarne Gasthuis, Haarlem
- 15 Frisius MC Leeuwarden, Leeuwarden
- 16 Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Leiden
- 17 Maastricht UMC+ (MUMC+), Maastricht
- 18 Radboudumc, Nijmegen
- 19 Erasmus MC, Rotterdam
- 20 Maastricht Ziekenhuis, Rotterdam
- 21 ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis), Tilburg
- 22 Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht), Utrecht
- 23 Isala, Zwolle



Daarnaast zijn er vier centra voor pediatrische hiv-zorg:

- A Emma Kinderziekenhuis (EKZ), Amsterdam UMC, Amsterdam
- B Beatrix Kinderziekenhuis (BKZ), UMCG, Groningen
- C Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam
- D Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ), UMC Utrecht

Over stichting hiv monitoring

Stichting hiv monitoring (SHM) verzamelt medische gegevens van mensen met hiv, uiteraard alleen na de expliciete toestemming van de betrokkene. Deze gegevens worden gebruikt voor onderzoek dat bijdraagt aan de kennis over hiv in Nederland. Data in deze samenvatting zijn afkomstig uit het hiv-monitoringrapport 2025. Het rapport bericht over de laatste ontwikkelingen en trends binnen de populatie mensen met hiv in Nederland. Het rapport verschijnt jaarlijks en rapporteert altijd over gegevens verzameld tot en met het voorgaande jaar.

Het hele rapport is beschikbaar via de QR-code of www.hiv-monitoring.nl/2025

